

MEDUSA *ungvicolata* och ACTINIA
pusilla;

Uptäckte och beskrifne af

OLOF SWARTZ.

Mångden af de alster, som erkänna Oceanens rymder och des afgrund för sin stamt-ort, upväcker billigt en Naturforskares förundran; och utaf dessa utgöra säkert Blötmaskarne icke det ringaste antalet.

BÄSTER, BOHADSH, LISTER, ELLIS, med flera hafya icke litet bemödat sig med dessa Djurens kändedom; de hafya beskrifvit och tecknat mångfaldiga slag, men man förmödar med skäl at en myckenhet mera återstår för tillkommande åldrar åt upptäcka.

Närvarande tvåne Blötmaskar, som jag har den åran at beskrifne infända, torde äfven bevisa detta. De hafya förekommit under mina Sjöresor til och uti Vest-Indien.

Den förste är en *Medusa*, som jag tror hit-tills varit okänd. Hon är icke större än en liten Muskot, men som i anseende til sin näta hopsyttning och brokiga yta är ganska vacker.

Som Djurets kännemärken icke lätteligen på annat än det för Natural-Historien lämpeligaste språket kunna tolkas, får jag lemina dem sådanna som de följande;

Corpus orbiculare, convexum, gelatinosum, dia-phylum, cærulescens, maculatum.

Superficies superior supra plana, alba, gelatinosa, puncto centrali purpureo, lateribus convexa; Radiis 1. Striis 16. longitudinalibus notata.

Margo

Margo crenatus; crenis 16; incurvatis æqualibus minutis, ungvibus 16, paryis subincurvis interjectis, tentaculorum vices præbentibus.

*Discus (superficies inferior) inferne concavus, medio convexiusculus, cui centro adnatum *Corpusculum* longitudine orbiculi apice subquadrilobatum, (l. brachia forte 4. connata.) longitudinaliter ex basi octo striatum, apice pervium, dilatans. (ubi os animalis.)*

Circa basin corpusculi 4-lobati, maculae 16 majores, fuscæ, vagæ; aliæ 32 minores magnitudine capitis aciculæ, extra alteras.

Latera orbiculi maculis atropurpureis asperfa, oculo armato vase serpentina numerosissima mentientibus.

Totum corpus gelatina diaphana, ex albido-cærulecenti tectum.

Hela kanten, äfven som den fyrdelte med-lersta kroppen, hopdräger sig skoftals ymsom eller utvidgas, antingen båda tillika eller hvarje färskildt, så väl dä Djuret rörer sig, som då det retas.

Det bibehåller sig altid så i vatnet, at den ihåliga delen vetter nedåt, och den platta öfra ytan upåt, hvarigenom den fyrdelte kroppen fallan eller aldrig synes.

Och som den på intet sätt kan föras til något af de flag, som finnas i Syft. Nat. uptagne, har jag kallat den;

MEDUSA ungvicolata.

Orbicularis, supra plana, 16 radiata, margine crenato, ungvibus 16 subincurvis.

Jag. fäg den i stor myckenhet simmande i Vest-Indiska Sjön nära Jamaica i Maji Månad 1786.

Jämte dennes beskrifning torde en annan
kunna bifogas på et kändt ilag af samma flag-
te, nemlig *MEDUSA pelagica* LINN. S. N. 1098.
n. 10. upfiskad i Atlanten, mellan 30 - 40 grader
Polhögd.

Corpus hæmisphaericum, concavum, gelatino-
sum, diaphanum; subdæruleum.

Superficies Superior rufo-maculata.

Margo crenato-incurvatus, sedecim emarginatus;
Lacinia ovatae, *Tentaculis* octo filiformibus
3-pollicaribus interjectis, rubris.

Discus subtilis convexiusculus 4-lobatus; quibus
ex lobis *Corpus* in 4 brachia dividitur a se
divergentia, lateribus dilatatis quasi alatis,
medio basi os inobscurens.

Lobi 4. (seu tubercula) ovati, pessacidi, cor-
pusculis gyrofisiis azureis intestinorum for-
ma repleti.

Djurets rörelse sker medelst kantens ojäm-
na hop- och sammandragande, åfven som då
och då genom armarnes krökningar.

Det är stundom en half aln i vidden, men
utdrages i vatnet til alnars längd, då något
däruti häftas, och uplyser ofta havsvatnet, ej
olika en eldbrand, i synnerhet då det vidrörer.

Då Djuret var nyfs upptaget och lefvande,
luktade det fränt, eller ågde en lukt närmast
liknande den af glödgadt Järn, som det smänin-
gom förlorade med lifvet, hvarefter det (efter
par dagar) förbyttes til et gelée och ruttnade.

Den

Den sednare *Blötmasken*, hvarå jag får lem-
na beskrifning och teknig, synes vara en
ACTINIA, ehuru väl ej aldeles med charakte-
ren af detta flagte öfverensstämmende.

Den är icke större än en stor Art, och sy-
nes i vatnet som en liten hvit ljus sjerna, är
icke heller olik en flytande Spindel.
Corpus ellipticum, apice contractus, dilatabile,
läve.

Rostrum radiatum: *Ore dentibus* octo incurvis,
nigris; *Radii* (*i. Tentacula*) 2ploris ordinis:
interiores juxta orificium denticulatum sede-
cim, 3plo breviore, longitudine 2 linearum;
exteriores octo, 5-6-linearum, teretes, un-
dulati, patuli, apice nigricantes.

Den torde få kallas:

ACTINIA pusilla.

Elliptica, *levis*; *radiis* duplicitis ordinis, *exteri-
oribus* apice nigris.

Den enda med hvilken den i Syft. Nat.
kunde jämföras, vore *A. equina*, med hvilken
den ej kan förenas.

Rörelsen var på denna nästan omärklig,
utom vid sjelfva mynningen, som något hop-
drogs. Lukten var aldeles lika den, som *Spon-
gia* åger.

Jag träffade den i Sept. 1783, uti Oceanen
under 57 graders latitud.

Engelske Sjömän kalla alla dessa i all-
mänhet *Blubbers*, och somliga af dem, gifva
dem namn af *Sea-Cunts*, som svarar emot Dan-
mark

skarnes Sockuse; (*Vulvæ marinæ*) förmödeligen för deras hopdragande och utvidgande egenskap.

De tjena trolien större delen til föda för Hvalarna, och andra af samma familie.


På Tabellen VI. utvisar;

Fig. I. *MEDUSA ungiculata*.

- a. b. I naturlig storlek.
- c. Genom Microscop flera gånger större.
- d. Samma på sidan ställd at medlersta kroppen synes.
- e. Hela Djuret up och ned samt ut- och invändt, hvarigenom de vid centrum befintlige fläckar kunnna synas.

Fig. II. *ACTINIA pusilla*.

- a. I naturlig storlek.
- b. Något större med de yttre radii borttagne.
- c. Hela Djuret genom Synglaset förstoradt.



Beskrif-

Beskrifning på et nytt Genus ibland Insecterna, hörande til Coleoptera efter Hr. Archiat. och Ridd. v. LINNÉS Systeme;

af

NILS SAM. SVEDERUS.

CERAPTERUS.

Character Genericus.

O, maxillis palpisque,

Palpi quatuor inaequales ultimo articulo longiori, latiori, depresso, truncato. Tab. VI.

Fig. 4. c, d microscopio auct., e magis auct.

Maxilla (mandibula Fabr.) brevis, apice cornua, arcuata, subulata. Fig. 4, a micr. auct., b magis auct.

Antennæ depressæ, subovatae, pinnatae Fig. 2, 3 micr. auct.: primo articulo concavo-clypeato, transverso Fig. 6. f micr. auct.

Oculi valde prominuli Fig. 1, 5. micr. auct.

I thorax planus immarginatus Fig. 1.

Elytra lateribus inflexo-convoluta Fig. 2, 5.

Obs. Genus esse medium inter *Silpham* & *Hispam* Lin. videtur.

Character Specificus.

CERAPTERUS latipes piceus, antennis octo-jugis: elytris macula flavecente: pedibus latissimis, tarsis intra tibias retractilibus.

Habitat in Honduras Americæ *).

Descri.

*). Denne besyntnerliga Insect förvaras uti Hr. Öfversten DAVIES's sköna Natural-Samling på Blackheath nära Staden Greenwich i England. Jag har också at tacka Hr. Öfversten helf för den väckra Ritningen derpå.